

Wichtige Informationen zu Schmerzmittel vor Operation:

Blutverdünnung

Bezüglich Vorgehen bei der Einnahme oder dem Absetzen folgender Medikamente ist **unbedingt** mit dem Anästhesearzt und dem Operateur Rücksprache zu nehmen. Unter Umständen soll die Operation auch unter Aspirin erfolgen. Dies ist zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, nach Stentimplantation oder einer Ballondilatation an den Herzkranzgefässen der Fall.

Wirkstoff	Handelsname
Acetylsalicylsäure	Aspirin [®] cardio, ASS Cardio Axapharm [®] , ASS cardio Spirig HC [®] , ASS Cardio-Mepha [®] , Cardiax ASS [®] , Cardioral [®]
Clopidogrel	Plavix [®] , Clopidogrel [®] (verschiedene Hersteller), Clopidrax [®]
Andere Plättchenhemmer	DuoPlavin [®] , Brilique [®] , EfiEnt [®]
Antikoagulantien	Sintrom [®] , Marcoumar [®] Clexane [®] , Calciparine [®] , Fragmin [®] , Fraxiparine [®] , Fraxiforte [®] , Arixtra [®] , Liquemin [®] , Sandoparin [®] Eliquis [®] , Lixiana [®] , Pradaxa [®] , Xarelto [®]

Schmerzmittel

Folgende Schmerzmittel müssen 10 Tage vor Operation gestoppt werden

Wirkstoff	Handelsname
Salicylate (nur, wenn als Schmerzmittel eingenommen)	Alca-C [®] , Alcacyl [®] , Alka-Direct [®] , Alka-Seltzer [®] , ASA-Tabs [®] , Ascosal [®] , Aspégic [®] , Aspirin [®] , Aspirin Complex [®] , Aspirin S [®] , Aspirin-C [®] , Aspro [®] , Contra-Schmerz plus [®] , Migpriv [®] , Togal ASS 500 [®] , Tagol [®]
Piroxicam, Tenoxicam	Felden [®] , Pirozol [®] , Piroxicam-Mepha [®] , Tilcotil [®]

Folgende Schmerzmittel müssen 4 Tage vor Operation gestoppt werden

Wirkstoff	Handelsname
Acemetacin	Tilur [®]
Dexibuprofen, Dexketoprofen	Seractil [®] , Ketesse [®]
Diclofenac	Arthrotec [®] , Diclac [®] , , Diclofenac [®] , Ecofenac [®] , Grofenac [®] , Inflammac [®] , Olfen [®] , Primofenac [®] , Tonopan [®] , Vifenac [®] , Voltaren [®] , Voltfast [®]
Etodolac, Flurbiprofen	Lodine [®] , Froben [®] , FlurbiAngin [®] , Strepsils [®]
Ibuprofen	Alges-X [®] , Algifor [®] , Aspégic [®] ibu, Brufen [®] , Contra-Schmerz [®] IL, Dismenol [®] , Dolocyl [®] , Dolo-Spedifen [®] , Grefen [®] , Ibu Sandoz [®] , Ibufen-L [®] , Ibuprofen [®] , Ibusifar [®] , Iproben [®] , Irfen [®] , Nurofen [®] , Optifen [®] , Saridon [®] , Sonotryl [®] , Spedifen [®] , Treupel [®] Dolo
Indometacin	Indocid [®]
Ketorolac, Lornoxicam	Tora-Dol [®] , Xefo [®]
Mefenaminsäure	Mefenacid [®] , Mefenamin [®] , Mefenamissäure [®] , Mephador [®] , Ponstan [®] , Spiralgin [®]
Naproxen	Aleve [®] , Apranax [®] , Naproxen [®] , Proxen [®]
Nimesulid	Aulin [®] , Nisulid [®]

Pflanzliche Arzneimittel

Folgende pflanzlichen Arzneimittel sollen 10 Tage vor Operation gestoppt werden

Wirkstoff	Handelsname
Mädesüss (Spiraeae ulmariae)	Künzle Erkältungstee
Weidenrindenextrakt (Salicis cortex)	Sidroga Erkältungstee N
Ginkgo- und Ginsengextrakt Knoblauch	A. Vogel Knoblauch Kapseln, Allvita [®] Knoblauch, Arkocaps [®] Ginseng, AVC [®] plus, Biorganic Geri [®] Gisand, Burgerstein Geriatrikum, Burgerstein TopVital, Fortevital [®] , Geroviton [®] , Gincosan [®] , Ginkgo Sandoz [®] , Ginkgoforce [®] , Ginkgo Mepha [®] , Ginsana [®] , IL HWA Ginseng, Morga Roter Ginseng, Panax Ginseng, Pharmaton [®] Vital, Phytopharma Ginseng, Phytopharma Knoblauch Weissdorn, Supradyn [®] Vital 50+, Rezirkane [®] , Symfona [®] , Symfonel [®] , Tebofortin [®] , Tebokan [®]